

Influencia del Plan de Sensibilización sobre Factores de Riesgo que Inciden en el VIH/SIDA de los Internos del Centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas- Amazonas

Influence of the sensitization plan on risk factors that incidence in HIV/AIDS of the inmates of the penitentiary center of Huancas - Chachapoyas - Amazonas

Manuel Jesus Quispe Narvaez¹

RESUMEN

El presente estudio de investigación fue de tipo experimental prospectiva longitudinal, Analítico. Tuvo como objetivo general: Determinar la influencia del Plan de Sensibilización sobre los Factores de Riesgo en el VIH/Sida de los internos del centro Penitenciario de Huancas - Chachapoyas. Amazonas-2014.; teniendo como muestra a 90 internos del pabellón A del Centro Penitenciario de Huancas; para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, técnica el cuestionario y como instrumentos el formulario de cuestionario para conocer el grado de sensibilización alcanzado luego de aplicado el Pre Test y Post Test una vez empezado y culminado el Plan de Sensibilización, la validez del formulario se determinó mediante juicio de expertos, Los resultados obtenidos fueron: del 91.1% de Internos Sensibilizados, un 8.9% presentaron poca sensibilización, así como un 0.0 % de internos no sensibilizados.

Palabras claves: Sensibilización, Influencia, Factores de Riesgo.

ABSTRACT

This research study was prospective longitudinal experimental , Analytical . Had as general objective : To determine the influence of Awareness Plan on Risk Factors in HIV / AIDS in Prison inmates Huancas center - Chachapoyas. Amazonas- 2014 .; as shown at 90 having internal flag A Prison Huancas ; Data collection for the survey method was used , the questionnaire technique as instruments form questionnaire to determine the level of awareness achieved after applying the Test Pre and Post Test once begun and completed the Awareness Plan , the validity of the form is determined by expert judgment results were : 91.1 % internal sensitized , 8.9 % had little knowledge and a 0.0 % non- sensitized inmates.

Keywords: Awareness, Influence , Risk Factors .

¹Magister en Gestión de los Servicios de la Salud, Docente de la Escuela Profesional de Enfermería UNTRM. Correo electrónico: imanolrive@hotmail.com. Cel: 947919275

I. INTRODUCCIÓN

En nuestro país desde que se identificó la introducción de la epidemia de VIH/SIDA, esta continúa siendo un problema de salud pública de difícil abordaje. Durante la primera década de la epidemia de VIH/SIDA en el Perú, en los años noventa, el Ministerio de Salud empezó a identificar los casos de SIDA por medio de una definición de caso que permitía identificar los casos de infección en estadio avanzado, ya que no se tenía disponibilidad de pruebas de laboratorio. A partir del año 1996, en que se crea por decreto la Ley N° 26626 (“Ley CONTRASIDA”), se creó e implementó el Programa Nacional de Prevención de ETS y VIH-SIDA – PROCETSS y se desarrollaron intervenciones sanitarias basadas en el control de la transmisión del VIH (sexual, vertical y parenteral) como: el tamizaje de los hemoderivados en los bancos de sangre, el tamizaje de VIH a las gestantes, atención médica periódica a los grupos de elevada prevalencia de ETS e intervenciones para cambio de comportamiento a través de la estrategia de pares. La Vigilancia Epidemiológica realizada en esos años, permitió determinar que la epidemia en Perú era de nivel concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, que parte de ellos con comportamiento bisexual estaban transmitiendo el VIH a las mujeres y ellas al salir embarazadas a sus hijos.

En la segunda década, con el advenimiento de los antirretrovirales, el Ministerio de Salud del Perú a partir del año 2004 inicia la más grande intervención sanitaria para proveer tratamiento antirretroviral de manera universal (TARGA), lo cual ha significado un gran esfuerzo para el Ministerio de Salud, la Sociedad civil, instituciones no gubernamentales, instituciones académicas y organismos de ayuda internacional como el Fondo Mundial, ONUSIDA, OPS, entre otras. Este trabajo conjunto ha permitido avances en la disminución de la mortalidad por VIH/SIDA, sobre todo en Lima, que como capital del país, concentra el 70% de los casos de SIDA, sin embargo, en el resto de país el avance es más lento. (DGE, 2013)

Aún tenemos por delante el reto de controlar la epidemia de VIH en el país y las tareas pendientes deberán ser asumidas con compromiso para contribuir a disminuir el impacto de la epidemia en nuestra población. En ese sentido, esperamos que esta investigación contribuya al diseño de las mejores intervenciones de prevención y control de la epidemia del VIH/SIDA en la Región.

En el Centro Penitenciario de Huancas, no se ah mantenido registro hasta el 2012, de un incremento en Casos confirmados de internos con VIH, a través

del tamizaje por prueba rápida como parte de las estrategias de promoción de la Salud por parte del Hospital Regional Virgen de Fátima, sin embargo dado el 2013 se da según estadística por epidemiología un caso reportado durante todo el año, siendo durante el 2012 y 2013 casos de Internos llegados de otros Centros Penitenciarios, sin embargo la presente investigación es motivada debido al incremento de manera abrupta de 7 Casos notificados siendo confirmados por tamizaje de Intervención Sanitaria, siendo estos casos como en años anteriores, internos rotados de otros centros penitenciarios, a esto aunado la aparición de un caso por confirmar que pertenece a la región Amazonas, esta realidad aunado a que no evidencia la promoción de la salud sexual dentro de la institución durante la visita conyugal, es lo que motiva la presente investigación y el desarrollo de la mismas con la finalidad de crear las bases técnicas junto con un análisis congruente que permitan responder a dicha problemática.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2Tipo de tipo Estudio fue experimental prospectiva longitudinal, Analítico, ya que el investigador asigno un factor de estudio y lo controlo a lo largo de la investigación, ya que buscan una relación causa-efecto (analíticos).

Evalúan efecto de intervenciones terapéuticas o preventivas.

Mantiene un estudio Cuasi Experimental, también manipulan deliberadamente al menos, una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, en estos diseños los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan sino que dichos grupos ya están emparejados antes del experimento: Son grupos intactos, la razón por la que surgen y la manera por la que se formaron es independiente o parte del experimento. Ya que consistió en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cual es el nivel del grupo en estas. (Sampieri, 2010, p.136).

La población estuvo constituida por los 558 internos del Pabellón A, B, C aunado de Programas del Centro Penitenciario de Huancas grado de control es mínimo, siendo esta investigación un Estudio de caso de una sola Medición. (Sampieri, 2010, p.136).

Se utilizó el muestreo probabilístico simple, ya que este tipo de muestreo ofrece una alta precisión y permitió generalizar los resultados probabilísticamente.

Se hará uso del método de la encuesta.(Canales, 2005). En función de los objetivos planteados en la presente investigación, en donde se proyecta el desarrollo de un Plan de Sensibilización en cuanto al Manejo de los Factores de Riesgo que inciden en el contagio y transmisión del VIH/SIDA en los internos del Pabellón a del Centro y ubicado en la Ciudad de Chachapoyas, ubicado dentro de la modalidad de proyecto factible, se emplearán una serie de instrumentos y técnicas de recolección de datos, orientada a alcanzar los fines propuestos.

En este sentido, como técnica de recolección se usaron, en primer término, la Revisión Bibliográfica, en la que se realizó el análisis de fuentes documentales, lectura de textos y materiales escritos de manera rigurosa, a fin de captar los planteamientos esenciales y aspectos lógicos de contenidos y propuestas con la finalidad de extraer los datos bibliográficos útiles al estudio.

III. RESULTADOS

A. El nivel Sensibilización sobre los factores de riesgo en el VIH/Sida de los internos del centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas, En el Pre Test. se encontraba en el nivel < No Sensibilizado> en un 2% que corresponde a (80) Internos, en el nivel <Poco Sensibilizado> tenemos un 8% (8), un 2% en el nivel <Sensibilizado>.

Esto contrastado con el Post Test demuestra la efectividad del plan de Sensibilización como estrategia de educación y de confirmación de la Hipótesis mediante un 91% que corresponde a (82) Internos sensibilizados, mediante el recojo de información del Pre test se pudo considerar la temática pedagógica a utilizar en el desarrollo del Plan.

Sensibilización	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Sensibilizado	2	2.2	82	91.1
Poco sensibilizado	8	8.9	8	8.9
No sensibilizado	80	88.9	0	0
TOTAL	90	100	90	100

t - student = 31.474; GI = 89; p = 0.000 < α = 0.05

B. El nivel Sensibilización sobre quienes pueden enfermar con VIH/Sida de los internos del centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas, En el Pre Test. se encuentra una total creencia sobre que el grupo de mayor probabilidad de contagio con los HSH con un 74% que corresponde a (67) Internos.

Ellos implica y da a conocer la falta de información

sobre la vulnerabilidad a la cual estamos expuestos todos los seres humanos independientemente a la orientación sexual que estos tengan, conocimiento que se observa ampliamente sensibilizado al mostrar el porcentaje que confirmó la alternativa de "Cualquier Persona", item que confirma el conocimiento de amplitud en cuanto a vulnerabilidad que obtuvo un 95% que corresponde a (86) Internos sensibilizados.

QUINES PUEDEN ENFERMAR	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Cualquier persona	7	7.8	86	95.6
Los drogadictos	8	8.9	4	4.4
HSH	67	74.4	0	0
Otros	8	8.9	0	0
TOTAL	90	100	90	100

C. En cuanto a el nivel Sensibilización respecto al tipo de Enfermedad de VIH/SIDA. de los internos del centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas, En el Pre Test. se encuentra una total creencia sobre que el VIH Sida es una enfermedad Parasitaria con un 57% que corresponde a (52) Internos, conocimiento importante ya que de ello implica conocer los riesgos de conocer la trasmisión de la enfermedad y la formas de la misma, por lo que se logró sensibilizar en este importante concepto reflejándose en el Post Test con un 93% que corresponde a (84) Internos sensibilizados.

Tipo de enfermedad	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Viral	5	5.6	84	93.3
Parasitaria	52	57.8	6	6.7
Ninguna	33	36.6	0	0
TOTAL	90	100	90	100

D. Sensibilización respecto al sexo sin preservativo de los internos del centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas, En el Pre Test. se encuentra una total creencia sobre que el VIH Sida es una A veces con un 68% que corresponde a (75) Internos esto que ha mostrado una total debilidad en el aspecto de promoción de la Salud el cual se tuvo en cuenta para el desarrollo del Plan pero sin embargo se vio dificultado debido a la falta de abastecimientos de Insumos como es el preservativo dentro de la Institución, debido a que el ministerio de Salud se encontraba desabastecido y que a la misma vez ejecutado el Post Test se evidencio con el mismo porcentaje.

Sexo sin preservativo	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Siempre	1	1.1	1	1.1
A veces	68	75.6	68	75.6
Pocas veces	21	23.3	21	23.3
TOTAL	90	100	90	100

E. El nivel Sensibilización respecto a la forma de transmisión de VIH/SIDA del centro Penitenciario de Huancas.- Chachapoyas, En el Pre Test. Se encuentra una total creencia sobre que el VIH Sida se contagia solo por vía sexual con un 48% que corresponde a (48) Internos esto que ha mostrado una total confusión ya que al enfocar la metodología en la prevención se ha confundido dicha interrogante ya que la población que participo mostro al Post Test una respuesta a esta interrogante como castigadora afirmando que son las relaciones Promiscuas con un 90% que corresponde a (75) Internos.

Forma de transmisión	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Jeringa	1	1.1	0	0
Contacto sexual	48	53.4	0	0
Fluido corporal	29	32.2	0	0
Relaciones promiscuas	12	13.3	90	100
TOTAL	90	100	90	100

F. Después de realizar la aplicación del Plan de Sensibilización sobre los Factores de Riesgo en el VIH/Sida de los internos del centro Penitenciario de Huancas - Chachapoyas. Amazonas-2014, se observa una total sensibilización en los internos del Pabellon A del centro penitenciario, tal y como se presentan en los resultados del cuadro 1, en la que la diferencia de las medias en todas las dimensiones y en la variable es a favor del pos test, la cual es corroborada por la t de student en la que la t calculada es mayor que la t tabular, además el p valor es menor que el nivel de significación, estos indicadores nos indican que la hipótesis nula ha sido rechazada y la hipótesis alterna.


Conoce organizaciones para enfermos	Pre test		post test	
	fi	%	fi	%
Hospital	85	94.5	85	94.5
Puesto de salud	3	3.3	3	3.3
Otra organización	1	1.1	1	1.1
No conoce	1	1.1	1	1.1
TOTAL	90	100	90	100

G. El plan de sensibilización influye sobre los factores de riesgo en el VIH/SIDA de los internos del centro penitenciario de Huancas – Chachapoyas . 2014., es aceptada porque todos los indicadores se ubican en la zona de rechazo]-∞; 1,86[∪]186; ∞].

Así mismo tenemos en el gráfico 3 que los porcentajes en el pre test tienden a mostrar un aumento de conocimiento de un 5% respectivamente al pos test tenemos que los porcentajes muestran un 90% respectivamente. Estos indicadores y cambios de un nivel a otro en cuanto a sensibilización demostrada mediante la identificación de del tipo de Enfermedad que se

considera al VIH/SIDA, y que ayuda a despejar creencias erróneas dentro de la subcultura del Penal, se debió a que se utilizó las estrategias didácticas planteadas en el plan de Sensibilización que se ha visto acompañado con una serie de estrategias que han mostrado la sensibilización deseada/.

Gráfico 03: Sensibilización de los de los internos del centro Penitenciario de Huancas – Chachapoyas respecto al tipo de Enfermedad de VIH/SIDA.



IV. DISCUSIÓN

Dichos resultados coinciden con Guerrero, M (2012), en su investigación Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales riesgosas ante el VIH/sida en población privada de la libertad. El caso de Cartagena, cuyo objetivos fue determinar los conocimientos, actitudes y posibles factores asociados a conductas sexuales de riesgo para adquirir VIH/SIDA, en personas privadas de la libertad, reclusos en los centros penitenciarios y carcelarios del Distrito de Cartagena. Estudio transversal, el universo fue 1516 personas privadas de la libertad reclusos en los centros penitenciarios y carcelarios del Distrito de Cartagena. La muestra se seleccionó mediante métodos aleatorios simples, se entrevistaron 272 reclusos través de un cuestionario USAID/DFID/FHI. Directrices para encuestas del comportamiento repetidas en poblaciones en riesgo al VIH/SIDA. 2000 encuesta PPL. Concluyendo que la PPL del Distrito de Cartagena evidencia prácticas de riesgo para la transmisión del VIH/SIDA. Se requiere más investigación y reorganizar estrategias de prevención acompañadas de un proceso de sensibilización, reconocimiento, aceptación y negociación de compromisos por parte de todos los actores sociales responsables, considero que este trabajo debe conllevar a implementación de programas y estrategias enfocadas para poblaciones vulnerables dentro de las cuales están inmersas las Poblaciones Privadas de su Libertad, que impliquen un trabajo articulado multisectorial de participación con Instituciones del Estado así como de

organizaciones de Base que participen en el apoyo y desarrollo de la mejora de actividades que vayan en beneficio de la promoción de la Salud de los centros penitenciarios de la Región.

Después de aplicar el plan de sensibilización basado en estrategias didácticas como las sesiones educativas participativas así como de actividades preventivo promocionales de la Salud, recordar que estas actividades de investigación de contacto con esta población nos demuestra que existe una alta compatibilidad entre el manejo de información dinámica participativa basada en estrategias didácticas y las necesidades de información y de sensibilización que las poblaciones privadas de su Libertad mantienen.

V. CONCLUSIONES

La aplicación del plan de Sensibilización basado en estrategias didácticas logró sensibilizar a los internos del centro Penitenciario de Huancas del Pabellón A - Chachapoyas. Amazonas-2014.

Se logró identificar las expectativas y necesidades latentes sobre la educación en VIH Sida, de los internos del Pabellón A del centro Penitenciario.

Se logró determinar y realizar estrategias para la creación del plan de Sensibilización sobre los factores de Riesgo, así como se logró ejecutar actividades articuladas con participación multisectorial en beneficio de toda la población penitenciaria.

VI. AGRADECIMIENTO

Al Gobierno Regional de Amazonas, a la ONG Chacha Viva, a todas las personas que directa e indirectamente apoyaron la investigación y el desarrollo de la misma.

A mis Madres, Maria y Delia; por los valores y principios inculcados así como a mis hermanas por ser inspiración de superación.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguilera, J. (2000, Octubre 10). [Informe Anual sobre Prevalencia de la Diabetes Mellitus tipo 2]. Washington: Organización Mundial de la Salud.

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. (5ta. ed). Venezuela: Edit. Episteme.

Lawrence W. Green And Marshall W. Kreuter (1983

). Health Promotion Planing an Educational and Environmental Approach. Año 1991– 2010. (2da. ed).EE.UU.

Arias, M. Solanny. (2001). Guía par la Prevención del SIDA en Alumnos de la III Etapa de Escuela Básica. Trabajo de Grado no Publicado Unellez-Barinas

Atlas de Sexualidad (1997). Ediciones LTDA, Santa Fe de Bogotá.

Balestrini, M. (2002). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. (6ta.ed.).Venezuela: Edit. BL.

Balestrini, M. (2002). Como se Elabora el Proyecto de Investigación. (6ta. ed.).Venezuela: Edit. BL.

Bassat, L. (1998) El libro rojo de la publicidad. Madrid: Ed. Espasa-Calpe

Bastidas, M. (2002). El SIDA como un Fenómeno Multidimensional en el Municipio Barinas. Año 2000 – 2002. Trabajo de Grado no Publicado Unellez-Barinas

Berelson, (2000) La decodificación de la vida cotidiana. Método de investigación cualitativo. Bilbao: Universidad de Deusto.

Blanco, Neligia (2000). Instrumentos de Recolección de Datos Primarios. Direccion de Cultura. Universidad del Zulia. Venezuela.

Cartaya; Vanesa. (1980). El Diseño de la Investigación en Ciencias Sociales. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) Según gaceta N 189.

Cervo, A. y Bervian, P. (1997). Metodología Científica. México: Edit. McGrawHill.

Chiavenato, I. (2001). Introducción a La Teoría General de la Administración;(5ta. ed). México DC: Editorial Mc Graw Hill.

Hernandez Siamperi, Roberto. Metodología de la Investigación. (5ta. ed). México DC: Editorial Mc Graw Hill.

Deiss, R.G., et al., Problem drinking is associated with increased prevalence of sexual risk behaviors among men who have sex with men (MSM) in Lima, Peru. Drug Alcohol Depend. (2013), <http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2013.01.011>

- DEVIDA. III Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2009. Disponible en: http://www.opd.gob.pe/cdoc/_cdocumentacion/NACIONALES%20PERU%20Aprobado%2001.06.11.pdf (Consultado el 18-06-2013).
- DEVIDA. IV Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General, 2010. Disponible en: http://www.opd.gob.pe/cdoc/_cdocumentacion/Informe_Ejecutivo_Poblacion%203%20B3n_General_2010.pdf (Consultado el 18-06-2013).
- Diccionario de la Real Academia Española (2006). España
- Dirección General de Epidemiología. 2013. Análisis de situación de salud del VIH/SIDA. 2013.
- Escribano, G., Fuentes, M. y Alcaraz, J. (2006). Políticas de Marketing. Madrid:Edit. Thomson Learning Ibero.
- Estrassen, J. (1997) La Ética de la Comunicación en el Campo de la Salud. Madrid: Forum Mundial de la Salud.
- Garber, I. (2001), Atención Integral del Paciente Diabético. (2da. ed). Mexico: Edit. McGraw Hill Interamericana.
- García M. : Programa Educativo sobre VIH/SIDA dirigido a los jóvenes que acuden a la consulta de adolescentes en el centro ambulatorio “Dr. Rafael Vicente Andrade” de Barquisimeto. (2003)
- Guerrero Gómez, Mayelis Isabel (2012) Conocimientos, actitudes y prácticas sexuales riesgosas ante el VIH/sida en población privada de la libertad. El caso de Cartagena. Acceso el 10 de Junio. Disponible en: <http://www.bdigital.unal.edu.co/10440/#sthash.bTpCcKzD.dpuf>.
- Hernandez, R., Fernandez, C. y Baptista, P. (2004). Metodología de la Investigación. (8va ed.) Mexico: Edit. Mc.Graw-Hill.
- Kotler P, Armstrong G, Camara E, Cruz I. (2004) Marketing. 10.a ed. Madrid: Prentice Hall.
- Kotler, P. (2001). Dirección de Mercadotecnia. (8va. ed.). Mexico: Edit. Diana. 65Lacroix, F. (2001). Educación, Base Primordial del Tratamiento. (1ra. ed.). Mexico DC: Editorial Norma.
- Lara J. 2006. Diseño de un programa orientado a reducir riesgos de infección por sida para los estudiantes de la carrera sociología de la unellez - barinas 2006.
- Lomov, B. (2001) El problema de la comunicación en psicología, La Habana: Ed. Ciencias sociales.
- López, C. 2013. En su investigación Prevalencia y factores de riesgo de malnutrición de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. Periodo 2012- 2013. Acceso el 08 de Junio de 2014. Disponible en <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/2699>,
- Manual sobre el SIDA para la Mujer, publicado por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. 1992.
- Manuel Cristancho G. José F. Muñoz G. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, 1998. Mérida – Venezuela.
- Marval, A. 2011. En su investigación titulada plan de intervención social para familias afectadas por el virus VIH/SIDA, que acuden al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcala (Huapa). Cumaná estado sucre, Año 2010-2011. Acceso el 10 de Junio. Disponible en <http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/handle/123456789/2326>
- Moleiro, S. (2003). El Mercadeo y la Publicidad en la Salud y su Impacto en la Calidad de Vida. Trabajo Especial de Grado de Licenciatura No Publicado. Universidad Central de Venezuela, Caracas
- Murray C, Lopez A. Measuring the Global Burden of Disease. N Engl J Med 2013;369:448-57.
- Osgood, (2000) La decodificación de la vida cotidiana. Método de investigación cualitativo. Bilbao: Universidad de Deusto66Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Informe de ONUSIDA sobre la epidemia mundial de SIDA, 2013. Disponible en: <http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiolog>

y/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_en.pdf (Consultado el 30-09-2013).

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Resumen mundial sobre la epidemia del SIDA 2013 Diapositivas Clave sobre Epidemiología. Disponible en: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/201309_epi_core_en.pdf (Consultado el 30-09-2013).

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). Global HIV/AIDS Response – Epidemic update and health sector progress towards Universal Access – Progress Report 2011. Disponible en: http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20111130_ua_report_en.pdf (Consultado el 12-06-2013).

Rangel, Mirian. (2001). Dinámicas del Proceso de Investigación Social. Barinas- Estado Barinas. Resolución del Ministerio de Educación y Deporte. N° 1.762, Según Gaceta Oficial el 11 de Octubre de 1966. Revista Tribunal Médica. Vol. 74, Febrero 1991, Pág. 31. Revista Espacio Abierto. Vol. 7. Enero – Abril 1998, Pág.

Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. (2005) Fundamentos de Marketing.(13a. ed.) Edit. Mc.Graw –Hill.

Thompson, I. (2005). Fundamentos de Marketing. (9na. ed.) Madrid: Edit. Ecasa.

Vagenas P, Ludford KT, Gonzales P, Peinado J, Cabezas C, Gonzales F, Lama JR, Sanchez J, Altice FL; for the Peruvian HIV Sentinel Surveillance Working Group. Being Unaware of Being HIV-Infected is Associated with Alcohol Use Disorders and High-Risk Sexual Behaviors Among Men Who have Sex with Men in Peru. AIDS Behav. 2013 May 14. [Epub ahead of print].